

میاستنی گراویس یک بیماری سیستم عصبی است که انتقال عصبی-عضلانی در عضلات ارادی بدن تحت تأثیر قرار می گیرد.

این بیماری با ضعف بیش از حد و خستگی به خصوص در عضلات ارادی و عضلانی که به وسیله اعصاب جمجمه ای عصب رسانی می شوند مشخص می شود.

برخی داروها میاستنی گراویس را تشدید می کنند. از این رو باید به هنگام استفاده از این دارو ها با پزشک خود مشورت کند. داروهایی که منع استفاده در این بیماری دارد شامل موارد زیر میباشد:



۱. مسکن ها:

داروهای مخدر شامل مورفین-پتدین-پنتازوسین



۲. بیحسی کننده:

پروکائین-لیدوکائین-بوپیروکائین-پریلوکائین



۳. آنتی اسیدها یا ملین های حاوی منیزیم:

مالوکس-مایلاتا-آلومینیوم هیدروکساید-منیزیم هیدروکساید



۴. ضد آریتمی ها:

کینیدین-لیدوکائین-پروکائین آمید



۵. ضد تشنج ها:

فنی توئین (با احتیاط مصرف شود)



۶. ضد فشار خون ها:

بتابلاکرها:

آتنولول-پروپرانولول-بتاکسولول-متوپرولول-کاروادیلول-لابتولول

مسدود کننده کانال های کلسیمی:

آمیلودیپین-وراپامیل-دلتیازم-نیفیدپین



۷. ضد سایکوزها:


کلرپرومازین



دانش

مرکز آموزشی درمانی نمازی
واحد آموزش ضمن خدمت

داروهایی که در بیماران میاستنی گراویس منع مصرف دارند



2Ba2.com

PT-HO-244

تهیه کننده: مریم گوهر نیا کارشناس پرستاری
اشرف معماریزاده کارشناس ارشد مراقبت ویژه
نوزادان

استاد علمی: دکتر عباس رحیمی جابری متخصص

نورولوژی

سال ۱۳۹۴

1. Myasthenia gravis Available from
<http://www.myasthenia.org/foundationofamerica> IMC

2. MD Consult (2014) accessed on
[http://www.mdconsult.com/das/patient/body/386084432-\(2012\)](http://www.mdconsult.com/das/patient/body/386084432-(2012))

3. Smeltzer, S. & Bar, B. (2010). Brunner & Suddarth's Text book of Medical Surgical Nursing. 12th ed. Lippincott Williams & Wilkins.

منابع:



۸. ضد روماتیسم ها:

کلروکین - پنی سیلامین



۹. سموم ارگانوفسفات



۱۰. ضد مالاریاها:

کلروکوئین - هیدروکسی کلروکوئین - مالاتیون -
پاراتیون - سم بوتولینوم یا بوتاکس