

تعریف بیماری

بیماری کالازار یک بیماری عفونی انگلی است که توسط نیش پشه حاکی انتقال می یابد. عامل ایجاد کننده این بیماری تک یاخته ای از جنس لیثمانیا می باشد و بیماری قابل انتقال بین انسان و حیوان است. دوره نهفتگی بیماری چند هفته تا چند ماه است و در ایران غالباً بیماری در اطفال زیر ۱۰ سال بخصوص کودکان ۶ ماهه تا ۲ ساله دیده می شود و بزرگسالان بخصوص تازه واردین به مناطق آلوده ممکن است مبتلا گردند.

مخزن بیماری

در ایران مخزن اصلی بیماری گوشتخواران وحشی (روباه - شغال) و سگ های خانگی می باشند و انسان بطور تصادفی مبتلا می گردد.

روشهای تشخیص

در مناطق بومی، بیماری بر اساس علائم تشخیص داده می شود. در معاینه فرد بزرگی کبد، طحال و غدد لنفاوی مشاهده می شود همچنین کاهش گلبولهای سفید خون (کمتر از ۴۰۰۰ گلبول سفید

در هر میلی متر مکعب خون) بیماری کالازار را مطرح می نماید.

تشخیص قطعی تنها بر اساس مشاهده مستقیم انگل در مواد حاصل از آسپیراسیون مغز استخوان، یا غدد لنفاوی پس از تهیه گسترش و روش رنگ آمیزی و همچنین استفاده از محیط کشت مخصوص و یا تستهای سرولوژیک اختصاصی امکان پذیر می باشد.

علائم

در ایران بیماری به دو فرم حاد و مزمن بروز می کند.

شکل حاد بیماری با شروع ناگهانی تب شدید، گاهی استفراغ و لرز است. در عرض یک تا دو هفته تب دائم و یا منقطع، بزرگی طحال و کبد، تورم غدد لنفاوی و خونریزیهای زیر جلدی دیده می شود. در بعضی موارد بیماران علایمی شبیه بیماری حصبه دارند که همراه با ضعف عمومی و تب بالا رونده تا ۴۰ درجه سانتی گراد می باشد. ممکن

است تب تا هفته ها طول بکشد و همراه با سایر علائم مانند کاهش وزن و خستگی همراه باشد.

درمان

استراحت در بستر، مراقبتهای پرستاری از نظر بهداشت، رژیم غذایی حاوی پروتئین کافی، ویتامینهای ضروری از مسائل عمده در درمان یک بیمار مبتلا به کالازار است. از انواع داروهای ضد انگل نیز در درمان این بیماری استفاده می شود. در صورت درمان به موقع، بیمار بهبود می یابد و به دچار آسیب های جدی نمی شود. تعدادی از بیماران ممکن است مبتلا به سایر عوارض مانند انواع عفونتهای شونده و حتی ممکن است منجر به مرگ گردد.

پیشگیری

مراقبتهای پیشگیری کننده فردی مانند:

- استفاده از لباس و پوشاندن مناطق باز بدن (بخصوص در ساعات غروب)
- مصرف پمادهای دور کننده حشرات
- استفاده از پشه بند در هنگام استراحت



فوق

مرکز آموزش درمانی نمازی
وامر آموزش ضمنی فرمت

کالازار



PT-HO-139

گردآورنده: فاطمه آزادیکارشناس ارشد پرستاری

بازبینی: اشرف معماریزاده کارشناس ارشد NICU

استاد علمی: دکتر غلامرضا پولادفر فوق تخصص عفونی کودکان

۱۳۹۵

- استفاده از توری برای پنجره ها
- اطلاع از مناطق بومی این بیماری

انتشار بیماری در ایران

بیماری کالازار در ایران در استان اردبیل در شهرستان مشکین شهر ، در جنوب فارس در شهرستان جهرم و روستاهای اطراف به شکل بومی وجود دارد.

منابع :

- Croft SL, Buffet PA. Leishmaniasis. In: Goldman L, Ausiello D, eds. *Goldman's Cecil Medicine*. 24th ed. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier; 2011:chap 356.
- <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth>
- <http://fa.pasteur.ac.ir>